

VOYAGE DE M. RENÉ CHUDEAU DANS LE SAHARA.  
DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DE BRENSKEA  
(COLÉOPTÈRES MÉLOLONTHIDES),

PAR M. EDM. REITTER.

**Brenskea**<sup>(1)</sup> **Chudeaui** nov. sp.

*Br. coronatæ* valde similis, sed paullo minor, magis oblonga, elytris distincte punctato-striatis, lateribus antice longe, postice sensim breviter ciliatis diversa. Oblonga, rufobrunnea, subtus dilutiore, antennis palpisque pallidis, clypeo apice quinque-dentato, in medio tuberculo transverso munito; prothorace transverso, coleopteris vix angustiore, lateribus et angulis posticis rotundatis, antrorsum magis angustatis, lateribus et angulis posticis minutis, valde obtusis, supra punctis sparsis, minus profundis obsito; scutello laevi, antrorsum impresso; elytris postice perparum latoribus, subtiliter punctato-striatis, striis  $1/4$  subaequalibus; tibiis anticis fortiter tridentatis, posterioribus extus unilaminatis. Long. 6 millim.

*Sahara* : Tamanghasset, en août (René Chudeau).

CATALOGUE DES PANORPIDES DES COLLECTIONS DU MUSÉUM,

PAR M. LONGINOS NAVAS.

M. Longinos Navas, de Sarragosse, ayant déterminé avec soin les Panorpidés du Muséum, le catalogue en a été dressé comme il suit :

**BOREUS HIEMALIS** L. — Suède, Dalécarlie (*Schöner*, 1837) ; Europe septentrionale (*Lefebvre*, 1835).

**CHLORISTA AUSTRALIS** Klug. — Australie, Victoria, région alpine (*v. Müller*, 1890).

**PANORPA ALPINA** L. — Suisse, Bérisal (*J. de Gaulte*, 1907) ; Vosges (*Coll. G. Fallou*, 1895) ; Seine-et-Oise, Saint-Len (*Ch. Brongniart*, 1896).

**P. AMURENSIS** Mac L. — Mandjourie, Ourga Tsitsikhar (*J. Chaffanjon*, 1896).

**P. BOUVIERI** Navas. — Japon, Kofou (*L. Drouart de Lezey*, 1906) ; Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1901).

**P. BICORNUTA** Mac L. — Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1906).

(1) *Wien. Ent. Zeitg.* 1891. 255. (Diagnose du genre *Brenskea*.)

P. CAVALERIEI Navas. — Chine, Kouy tchéou, Kouy yang (*P. Cavalerie*, 1906).

P. COGNATA Rambur. — Environs de Paris (*Bagriot*, 1856): Fontainebleau (*A. Finot*, 1897).

P. CORNIGERA Mac L. — Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1901).

P. COMMUNIS L. — Environs de Paris (*Bagriot*, 1856): Seine-et-Oise. Chaville (*G. Bénard*, 1903): Forêt de Villers-Cotterets, Aisne (*R. du Buysson*, 1904): Fontainebleau (*P. Lesne*, 1901); Seine-et-Oise. Saint-Clond (1880): Forêt de Coye (*A. Finot*, 1897); Pyrénées, Gavarnie (*L. Pandellé*, 1906); Normandie (*H. Lucas*); Seine-et-Oise. La Frette (*J. de Gaulle*, 1907); Seine, forêt de Sénart (*Coll. G. Fallou*, 1895): Seine-et-Oise. Saint-Leu (*Ch. Brongniart*, 1896); Jura, Revigny (*N. Convers*, 1907); Puy-de-Dôme, La Bourboule (*R. du Buysson*, 1907); Jura. Les Rousses (*P. Lesne*, 1903); Pyrénées, Eaux-Bonnes (*L. Dufour*, 1834).

P. COMMUNIS L. var. VULGARIS Imoff. — Environs de Paris; Aisne, forêt de Villers-Cotterets (*R. du Buysson*, 1904).

P. CONFUSA Westw. — État-Unis. Westfield; Mosholu (*L. Navas*, 1909).

P. DAVIDI Navas. — Chine, Mou pin (*A. David*, 1870).

P. DROUARTI Navas. — Japon, Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lezey*, 1906).

P. DYSCOTA Navas. — Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1906); Kofou (*L. Drouart de Lezey*, 1906).

P. HARMANDI Navas. — Cochinchine, Monts Chaudoz (*J. Harmand*, 1877).

P. GERMANICA L. — Environs de Paris (*Bagriot*, 1856): Seine-et-Oise, Viroflay (*E.-L. Bourier*, 1899); Forêt de Saint-Germain (*G. Bénard*, 1903); Seine-et-Oise, forêt de Sénart (*Coll. G. Fallou*, 1895); Seine-et-Oise. Saint-Leu (*Ch. Brongniart*, 1896); Moulin de Sannois (*R. Lebrun*, 1900); Normandie (*H. Lucas*); Calvados, entre Villers et Dives (*P. Lesne*, 1901); Aisne, forêt de Villers-Cotterets (*R. du Buysson*, 1904); Hautes-Pyrénées (*L. Pandellé*, 1906); Seine-et-Marne, Fontainebleau (*A. Finot*, 1897).

P. GERMANICA L. var. BOREALIS Steph. — Alpes (*Coll. Giraud*, 1877); Seine-et-Oise, Saint-Leu (*Ch. Brongniart*, 1896).

P. JAPONICA Thunb. — Japon, Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lezey*, 1906); Japon, Kiou siou (*J. Harmand*, 1906); Environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1906); Japon, Kiou siou, bassin supérieur de la Sendaigawa (*E. Gallois*, 1906).

P. KLUGI Mac L. — Japon, Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lezey*, 1906).

P. LEICOPTERA Uhler. — Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lezey*, 1906).

P. LEWISI Mac L. — Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1901).

- P. LIMBATA* Navas. — Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1901).
- P. LUGUBRIS* Swed. — Canada (*Coll. Bose*, 1828); Caroline (*L'Hermier*); Antilles (*Plée*, 1828); Savannah (*Delarue*, 1836).
- P. MERIDIONALIS* Rambur. — Pyrénées, Eaux-Bonnes (*L. Dufour*, 1834); Gavarnie (*L. Pandellé*, 1906); Pyrénées orientales, Py (*P. Lesue*, 1906); Espagne, Miracle (*L. Navas*, 1907); Naples (*A. Costa*, 1853); Grèce, île d'Eubée (de Mimont. 1856).
- P. MERIDIONALIS* Ramb. VAR. *FENESTRATA* NAVAS. — Espagne, Orbigosa (*L. Navas*, 1907).
- P. NAEVIA* Navas. — Japon, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1906).
- P. NIPALICA* Navas. — Sikkim (*J. Harmand*, 1890).
- P. NIPPONENSIS* Miyake. — Nippon moyen, environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1906).
- P. NUPTIALIS* Gerst. — Texas (*Mac Lachland*, 1881).
- P. OCELLARIS* Navas. — Sikkim (*J. Harmand*, 1890).
- P. PICTA* Hagen. — Caucase (*Waga*, 1837); Alpes pontiques (*Deyrolles*, 1869).
- P. RUFa* Gray. — Amérique (*Roger*, 1834).
- P. STIGMALIS* Navas. — Chine, Mou pin (*A. David*, 1870).
- P. TERMINATA* Klug. — Mexique, territoire de Tépéc. Cerro San Juan (*L. Diguey*, 1898).
- P. WORMALDI* Mac L. — Japon, Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lézey*, 1906).
- PANORPODES NOTATA* Navas. — Japon, Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lézey*, 1906).
- P. PARADOXA* Mac L. — Japon, Kofou (*L. Drouart de Lézey*, 1906); Environs de Tokyo (*J. Harmand*, 1901).
- EUSTHENIA SPECTABILIS* Mac L. — Australie (*J. Verreaux*, 1847).
- BITEACUS AUSTRALIS* Klug. — Tasmanie (*J. Verreaux*, 1844-1847); Australie (*Coll. Guériu-Ménéville*); Melbourne (1859); Victoria, région alpine (v. *Müller*, 1890).
- B. CAPENSIS* Thunb. — Afrique australe (*Delalande*).
- B. INDICUS* Walker. — Pondichéry (*M. Maindron*, 1880).
- B. ITALICUS* Müll. — Lyon (*Coll. Bose*, 1828); Beaucaire (*Audouin*, 1834); Fontainebleau (*A. Finot*, 1897); Saragosse (*L. Navas*, 1907).
- B. LAEVIPIES* Navas. — Japon, Nippon moyen, Kofou (*L. Drouart de Lézey*, 1906).
- B. NEBULOSUS* Klug. — Mozambique, vallée du Pungoué. Guengère (*G. Vasse*, 1906).
- B. PILICORNIS* Westw. — États-Unis, White Plains (*L. Navas*, 1909).
- B. STRIGOSUS* Hagen. — États-Unis, White Plains (*L. Navas*, 1909); Illinois (*Mac Lachlan*).
- B. TESTACEUS* Klug. — Abyssinie (*Ch. Michel*, mission de Bonchamp).

1899); Abyssinie, provinces équatoriales. pays de Dimé (*mission du Bourg de Bozas*, 1903); Mozambique, province de Gorongosa, tendos du Sun-goué, alt. 40 mètres (*G. Vasse*, 1907).

THYRIDATES CHILENSIS Klug. — Chili (*Gay*, 1843-1849).

DIPLOSTIGMA SINENSE Walker. — Chine, Kiang-si (*A. David*, 1869).

HAPLODICTYUS CHEVALIERI Nav. — Région du Tchad. Kanem (*A. Chevalier*, 1904); Obok (*D<sup>r</sup> Jousseume*, 1897).

H. POBEGINI Navas. — Côte d'Ivoire, Baoulé (*H. Pobéguin*, 1897).

---

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. LE BARON MAURICE DE ROTHSCHILD  
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE.

Insectes hyménoptères : Mellifères.

PAR M. J. VACHAL.

**Megachile brachiata** nov. sp.? ♂.

Patte 1 rouge, moins le bord externe du tibia (quelquefois les 4 pattes postérieures rougeâtres).

Les poils du disque du mésomotum rembrunis, ceux des mésopleures noirâtres. Segments 1-5 à fascies de poils gris-roussâtre, une fascie basale sur le segment 4, le segment 5 vêtu de poils gris-roussâtre, semés de soies noires, 6 à duvet gris même en dessous de la crête transversale; segments ventraux 2-4 à fascie apicale demi-dressée, interrompue sur 4.

Tarse 1 dilaté, l'angle apical interne des articles basaux prolongés en pointe aiguë, couvert de duvet blanc avec la frange externe roussâtre au bout. Tranche externe du tibia 2 sinuée près du bout (comme celle du tibia 1, et par suite bi-épineuse. Frange postérieure du prototarse 2 et l'antérieure du prototarse 3 peu épaisses à longs poils blancs. Crête anale peu saillante, en arc de cercle, irrégulièrement denticulée. Aile d'un bronzé hyalin à nervures brunes.

Long. : 12-12 millim. 5; aile : 8 millim. 7.

1 ♂ du sud du lac Rodolphe (M. de Rothschild) et 1 ♂ d'Abyssinie (Raffray), celui-ci à pattes postérieures noires; tous deux au Muséum de Paris.

**Megachile attenuata** nov. sp. ♂.

Tous les tarses et le dedans du tibia 1 d'un rougeâtre obscur. Sont noirâtres, longs et dressés les poils sur la ligne transverso-médiane du vertex, sur l'arrière du disque du mésomotum et sur le scutellum; sont noirs les petits poils dressés sur la base des segments 2-4 et sur la ligne